

毛孔性苔癬治療

二の腕や背中にみられるブツブツとした盛り上がりは「毛孔性苔癬(もうこうせいいたいせん)」と言い、毛穴に古い角質が詰まり、部分的に皮膚が肥厚して硬く盛り上がる皮膚疾患です。

当院では、真皮から皮膚を再生させる「ダーマペン4」というマシンと、角質の溶解、剥離作用とコラーゲン活性の相乗効果を持つ「ピーリング剤」とを組み合わせることにより、肌の深くから表層まで生まれ変わりをもたらす治療を行っています。複数回、施術を繰り返すことで、ざらつきのない、なめらかな肌触りを取り戻すことが可能です。



効果

毛孔性苔癬の改善

肌のざらつき改善

ハリ・弾力アップ

肌質改善

こんな部分のブツブツ・ざらつきに

二の腕


背中

ヒップ

太もも


毛孔性苔癬とは

毛穴に古い角質が詰まり、部分的に皮膚が肥厚して硬く盛り上がる皮膚疾患。触るとブツブツ、ザラザラし、赤みや茶褐色の色素沈着が生じる場合もあります。痛みなどの自覚症状はほとんどなく、放置していても健康上に大きな問題を引き起こすことはありません。一般的に思春期に多くみられ、年齢を重ねることで自然治癒することもあります。発疹の大きさは、およそ1~3mmで、二の腕、背中(肩甲骨あたり)、ヒップ、太ももにみられ、発症原因は遺伝の他に、ホルモンやビタミンの代謝異常、外的刺激などの複数の要因が考えられます。



毛孔性苔癬治療のポイント

当院では、「毛孔性苔癬」に対して、深層と表層のそれぞれにアプローチする施術を組み合わせる治療を行っています。



皮膚表面に溜まった、古い角質を除去することでターンオーバーを促し、毛穴に硬くつまった角質が排出されざらつきが解消されるだけでなく、肌のハリに必要なコラーゲン生成を促されるため、より早くなめらかな肌へ改善できます。

特長

皮膚そのものを「新しい肌」に入れ替える「ダーマペン4」

ダーマペン4は、先端についている髪の毛よりも細い極細針で皮膚表面に肉眼では見えないほどの微細な穴を一時的作る「マイクロニードリング法」と呼ばれる施術です。傷を修復する治癒能力と同じ作用により、元々の皮膚の新陳代謝を促し、肌を生まれ変わらせることができます。



『ダーマペン4』のメカニズム

①マイクロホールを開ける

「ダーマペン4」をお肌にあて肌表面に微細な穴を一時的に開けます。

②コラーゲン産生

傷を治そうと自然治癒が働き線維芽細胞が活性化し、コラーゲン生成を促進します。

③肌再生

肌を生まれ変わらせ、ハリと弾力をもち、毛穴を引き締めます。

※図はイメージです。

ダーマペン4の優れた点

米国FDA承認の医療機器

アメリカの厚生労働省にあたるFDA(米国食品医薬品局)の承認を得た医療機器で、安全性と効果が確認されている信頼性のある安全な機器を使用します。

短い施術時間

16本の極細針が、1秒間に約120回高速振動をすることで、目には見えない微細な穴を毎秒1920個作ることが可能です。従来のダーマペンやダーマローラーによる治療に比べ、治療時間も短くなり、不快感が軽減されました。



痛み、ダウンタイムの軽減

ダーマペン4に搭載されている針は髪の毛よりも細い極細針で、従来のダーマペンやダーマローラーに比べても針が細いことに加えて、針刺しスピードの速さが特長です。これにより、施術時の皮膚へのダメージが軽減でき、痛み、赤みや内出血などのダウンタイムを最小限に抑えられます。

優れた浸透性で効果を最大限に発揮

ダーマペン4で開けた微細孔から浸透させると、製剤をただ塗布するだけの時と比べて肌への浸透率が各段に高まります。そのため、皮膚内部へ有効成分がしっかりと浸透し製剤による作用が最大限引き出されます。さらに、ダーマペン4による表皮活性、肌再生作用が加わることで美肌・リジュビネーションの相乗効果が発揮されます。

ターンオーバー促進、コラーゲン活性を兼ね備えたピーリング剤「ミラノ・リピール」

毛孔性苔癬治療で、皮膚再生に優れたTCA(トリクロロ酢酸)をはじめとする5種の酸(ラクトピオン酸、サリチル酸、タルトール酸、クエン酸)に加えて、コラーゲン活性を促す豊富な有効成分が配合されたピーリング剤「ミラノ・リピール」を使用します。

『ミラノ・リピール』の4つの機能成分

剥離と活性

TCA50% ラクトピオン酸 サリチル酸 クエン酸

角質細胞を溶解、剥離させ有効成分を促進、新しい肌生まれ変わらせます。

コラーゲンブースター

グリシン プロリン ヒドロキシプロリン ビタミンC

コラーゲン合成を促進・活性化、劣化したコラーゲンを修復。直接的に肌細胞を刺激して肌の再生を活性化。

皮膚再生

ガンマアミノ酪酸 アルギニン リポフラボン

肌のリフティング効果、神経の弛緩およびその結果生じるしわの原因となる筋肉を緩和することでしわ防止効果。

保湿と浸透性

スクワラン ミリスチン酸イソプロピル

角質を柔らかくするエモリエント作用。皮脂膜の代わりにバリアをサポートし、乾燥や肌荒れなど肌トラブルを予防。キメの乱れや毛穴目立ちの抑制。

ミラノリピールの優れた点

製剤の保護と安定性を維持する「2相テクノロジー」

親油相と親水相からなる2相性テクノロジーにより、酸化・変性しやすいTCA(トリクロロ酢酸)や他の活性成分を酸化から守ります。これにより安定した品質が保てるため、製剤が本来持つ効果を最大限に発揮できます。

痛み、赤みを軽減する「国際特許技術による特殊製法」

TCA(トリクロロ酢酸)は皮膚再生効果に優れているものの、施術時の痛みや赤みが激しく、ダウンタイムもあるため敬遠されがちな施術でした。毛孔性苔癬治療で使用する「ミラノ・リピール」では、国際特許技術によって開発された製法を用いることで、50%と高濃度でありながら、痛みや赤みなどのダウンタイムを抑えつつ、皮膚に優しく効果的に浸透させることが可能になりました。

施術の流れ

- 診察** 医師が診察を行い、症状やお肌状態を拝見して施術内容、針の深さ、ピーリングの作用時間などを決定します。
- 撮影** 術前のお写真を撮影します。
- 麻酔** 麻酔クリームを塗布。約30分ほど経過すると麻酔効果が現れます。
- 処置** ダーマペン4とピーリング剤を用いて処置を行います。通常約30分の処置となります。
- 鎮静ケア冷却** 術後の腫れや赤みを軽減させるセバリアエクストリームケア(鎮静・再生ケア)を塗布し、クーリングします。※約10分オプションでSR5マスクを追加していただけます。
- 外用剤塗布** 施術部位に炎症予防の外用剤を塗布します。
- 施術終了** 日傘や上着で紫外線を防御してお帰りください。日焼け当日は、日焼け止めは塗布できません。※施術当日は、シャワー浴のみ可。

施術ベース

症状によっては1回の施術でもブツブツとした丘疹の減少を実感できますが、4~6週間に1回のペースで4~5回程度継続して施術されることをお勧めします。(皮むけが強い場合は、皮むけがおさまってから施術可能となります。)

※同部位のエステメニューは赤み、内出血、むくみ感、皮むけが引いてからお受けいただけます。
※脱毛等のレーザー施術は、2週間以上空けて、皮むけ等の症状が引いてからお受けいただけます。

ダウンタイム

- 処置直後は強い赤み、むくみ感がありますが翌日には強い赤味が落ち着き2~3日程度かけておさまります。
- 処置後にかゆみが出る可能性があります。クーリング、保湿により鎮静します
- 処置3~5日後くらいから、皮むけが起こり、2~3週間程度継続します。

施術料金

部位	所要時間 ^{※1}	初回	1回	3回コース ^{※2}
二の腕	約30分	38,500円	60,500円	148,500円 (1回あたり49,500円)
背中上部	約30分	38,500円	60,500円	148,500円 (1回あたり49,500円)
お尻	約30分	38,500円	60,500円	148,500円 (1回あたり49,500円)
その他部位 (20x20cm以内)	約30分	38,500円	60,500円	148,500円 (1回あたり49,500円)

オプション:SR5マスク 1,100円

※1 別途、麻酔時間。

※2 コースは1年間有効です。

・治療の一環として、別途セバリアエクストリームケア(9,600円)もしくはセラミド美容液(4,610円)とヒルドイドローション(1,100円)を購入していただく必要があります。

・その他部位: 胸腕、太もも前面、太もも後面など。

・初回: はじめて毛孔性苔癬治療を受けられる方。
(二の腕、背中上部、お尻、その他部位より1カ所のみ初回料金適用)

・麻酔代 1,100円 ・当院は全て税込表記となります。

禁忌事項

- 妊娠中、授乳中の方
- 日焼け直後の方、強い紫外線を浴びる予定や日焼けする予定のある方
- 皮膚炎のある方(脂漏性皮膚炎、かぶれ、湿疹、ケロイド・活動型ニキビ・いぼ・アトピー症状・創傷・ヘルペス感染症、またはその他の皮膚に炎症のある方)、極度の皮膚が敏感な方
- 治療部位に傷跡や化膿、強い色素沈着、感染症の皮膚疾患がある方
- 膿疱性酒さ・強皮症・日光性色素沈着の方
- 治療部位に皮膚ガンのある方
- アスピリン喘息の方、アスピリンアレルギーのある方
- 鉄アレルギーのある方
- 重度の基礎疾患・血液疾患・免疫不全のある方
- B型肝炎、C型肝炎など感染症のある方
- ニキビ治療薬(アクリノト・ロキソ) その他ヒトDNA誘導体による治療中の方、および治療終了後1ヶ月未満の方

注意確認事項

- 処置当日は、施術部位へはセラミド美容液のみを使用し、日焼け止めは使用しないでください。
- 処置当日は、激しい運動、アルコールの摂取は避けてください。(シャワーは可能)
- 処置翌日から、皮むけが落ち着くまでは、セラミド美容液とヒルドイドローションで保湿を十分にを行い擦らない様にしてください。
- 皮がむける前と皮むけている間は、かゆみを伴う可能性があるため、保湿と冷却を併用してください。
- 処置後に炎症後色素沈着になる可能性があるため、予防のために自宅での十分な保湿とUVケアをして頂き、日に焼けないように十分注意してください。
- 刺激やピーリング作用のある薬・化粧品を併用する際は、処置前後に休止期間を設けてください。
- 症状によっては1回の施術でも効果を実感できますが、4~6週間に1回のペースで4~5回程度継続して施術されることをお勧めします。(皮むけが強い場合は、皮むけが収まってから施術可能となります。)
- 清潔な状態で施術を行っておりますが、傷が治る過程で感染症が起こる可能性はゼロではありません。発生時はクリニックへご連絡ください。

対象となる薬・化粧品	処置前の使用	処置後の使用
当院で処方された治療用タカミクリニックピール、自宅用ピーリング剤	2日前から中止	赤みが無い状態で使用開始
市販のピーリング剤、ピーリング石けん、スクラブ剤	2日前から中止	赤みが無い状態で使用開始



<術前>



<17日後>