

# シミ内服セット

|   |   |  |   |    |  |
|---|---|--|---|----|--|
|  | シナール配合錠   | 朝  | 昼 | 夕  |  |
|   |   | 2錠                                       |   | 2錠 |  |
| <input type="checkbox"/>  | <b>主な作用</b><br>ビタミンCとパントテン酸の配合錠です。シミの原因であるメラニン色素の生成抑制作用と、すでにあるメラニン色素の排出促進作用があります。 | <b>注意事項</b><br>尿糖検査結果を陽性から陰性に変えることがあります。 |   |    |  |

|   |  |             |   |    |  |
|---|--|-------------|---|----|--|
|  | ハイチオール錠80  | 朝           | 昼 | 夕  |  |
|   |  | 2錠          |   | 2錠 |  |
| <input type="checkbox"/>  | <b>主な作用</b><br>アミノ酸の一種のL-システインです。皮膚の代謝に関与します。メラニン色素の生成抑制作用と、肌の代謝促進作用があります。 | <b>注意事項</b> |   |    |  |

|   |  |             |   |    |  |
|---|--|-------------|---|----|--|
|  | ユベラ50mg  | 朝           | 昼 | 夕  |  |
|   |  | 2錠          |   | 2錠 |  |
| <input type="checkbox"/>  | <b>主な作用</b><br>ビタミンEです。強い抗酸化作用があります。末梢の血行を促進して、酸素や栄養素をスムーズに運ぶことで肌の代謝が整います。 | <b>注意事項</b> |   |    |  |

|   |  |                                       |   |       |  |
|---|--|---------------------------------------|---|-------|--|
|  | トランサミン250mg  | 朝                                     | 昼 | 夕     |  |
|   |  | 2カプセル                                 |   | 2カプセル |  |
| <input type="checkbox"/>  | <b>主な作用</b><br>シミの原因となるメラニン色素を生成する細胞であるメラノサイトを活性化するプラスミンという物質の働きを抑えることにより、メラニンの産生を抑制します。抗アレルギー作用、抗炎症作用もあります。 | <b>注意事項</b><br>ビルや止血薬を飲んでいる方は服用できません。 |   |       |  |